

D. Parent (1), K. Aïnine (2), A. Rallet (1), J.-B. Rey (1).
1) Département de Pharmacie, (2) Service Hygiène
Institut Jean-Godinot, 1 Avenue du Général Koenig, 51056 Reims cedex

Introduction

La commission des anti-infectieux de notre établissement recommande de réserver l'usage de ciprofloxacine en cas de suspicion ou d'infection documentée à *P. aeruginosa*.

La réalisation d'audits permet de dresser un bilan de la collaboration entre oncologue, infectiologue et pharmacien dans la prescription des anti-infectieux

Patients et méthode





Fig 1 : Pathologie primitive traitée

L'ensemble des patients est à un stade métastatique de la maladie.

Un relevé exhaustif des prescriptions comportant une fluoroquinolone du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2008 a été réalisé. Une analyse rétrospective des prescriptions a été menée par un infectiologue et un pharmacien.

Résultats



Discussion - Conclusion

2 prescriptions de ciprofloxacin concernaient une infection documentée à *P.aeruginosa*. Une troisième non documentée se justifiait par l'état clinique du patient hospitalisé pour une pneumopathie. En revanche pour les **2 dernières indications un avis pharmaceutique aurait pu permettre la prescription d'une autre molécule**. Dans cette études les antibiotiques associés aux fluoroquinolones n'apparaissent pas. Ces résultats montrent le bénéfice **d'échanges quotidiens entre médecins et pharmaciens**.